

ตารางที่ 1

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำแนกตามอายุ



วัคซีน	อายุ			
	18–26 ปี	27–64 ปี	อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป	
วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน	กระตุ้นด้วยวัคซีนบาดทะยักและคอตีบทุก 10 ปี			
	กระตุ้นด้วยวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน แทนวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ 1 ครั้ง			
วัคซีนไข้หวัดใหญ่	ทุกปี ปีละ 1 เข็ม		ทุกปี ปีละ 1 เข็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)	
วัคซีนโควิด 19	ทุกปี ปีละ 1 เข็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)		ทุกปี ปีละ 1 เข็ม (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)	
วัคซีนหัด คางทูม และหัดเยอรมัน	2 เข็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)			
วัคซีนอีสุกอีใส	2 เข็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)			
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี	2 เข็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)			
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี	ดูข้อมูลเพิ่มเติม	3 เข็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)		
วัคซีนเอชพีวี	3 เข็ม (ชาย)	อายุ 27–45 ปี		
	3 เข็ม (หญิง)			
วัคซีนนิวโมค็อกคัส	วัคซีนชนิด 20 สายพันธุ์ 1 เข็ม หรือวัคซีนชนิด 13 หรือ 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม และพิจารณาตามด้วยวัคซีนชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)		วัคซีนชนิด 20 สายพันธุ์ 1 เข็ม หรือวัคซีนชนิด 13 หรือ 15 สายพันธุ์ 1 เข็ม และพิจารณาตามด้วยวัคซีนชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)	
	วัคซีนชนิด 20 สายพันธุ์ 1 เข็ม หรือวัคซีนชนิด 13 หรือ 15 สายพันธุ์ 1 เข็มและพิจารณาตามด้วยวัคซีนชนิด 23 สายพันธุ์ 1–2 เข็ม ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งรวมถึงผู้ที่มีภาวะน้ำหล่อเลี้ยงสมองไขสันหลังรั่วและฝังประสาทหูเทียม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)			
วัคซีนอาร์เอสวี	1 เข็ม ในสตรีมีครรภ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)		1 เข็ม (อายุ 60–74 ปี) (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)	1 เข็ม (อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป)
วัคซีนจูสวัต (ชนิดเชื้อเป็น)			1 เข็ม (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)	
วัคซีนจูสวัต (ชนิดไม่ใช้เชื้อเป็น)	2 เข็ม ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง		2 เข็ม (อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป)	
วัคซีนไข้เลือดออก (ที่มีแกนหลักเป็นไวรัสเดงกี)	2 เข็ม (อายุ 4–60 ปี)			
วัคซีนไข้เลือดออก (ที่มีแกนหลักเป็นไวรัสไข้เหลือง)	3 เข็ม (อายุ 6–45 ปี) เฉพาะผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเท่านั้น			
วัคซีนไขสันหลังอักเสบเจอี	1, 2 หรือ 3 เข็ม ขึ้นกับชนิดของวัคซีนและความเสี่ยง (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)			
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น	1, 2 หรือ 3 เข็ม ขึ้นกับชนิดของวัคซีนและความเสี่ยง (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)			
วัคซีนฝีดาษลิง	2 เข็ม		1 หรือ 2 เข็ม ขึ้นกับความเสี่ยงและประวัติการรับวัคซีน	

● แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ตามอายุ หรือไม่มีหลักฐานว่ามีภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรค
 ● พิจารณา (วัคซีนทางเลือก) สำหรับผู้ใหญ่ตามอายุ
 ● แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ ที่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม
 ● แนะนำตามการตัดสินใจทางคลินิกร่วมกัน
 ● ห้ามจัดหรือต้องระมัดระวัง
 ● ไม่มีคำแนะนำโดยเฉพาะ

ตารางที่ 2

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรทางการแพทย์



วัคซีน	ตั้งครรรร	บุคลากร สาธารณสุข	โรคหัวใจ เบาหวาน หรือ โรคปอดเรื้อรัง	โรคไตเรื้อรัง	โรคตับเรื้อรัง	ไม่มีบ้าน	เอชไอวี	ภาวะภูมิคุ้มกัน บกพร่อง	หลังการปลูกถ่าย	นักเดินทาง	
วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน	วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน หรือวัคซีน ไอกรน 1 เข็ม	กระตุ้นด้วยวัคซีนบาดทะยักและคอตีบทุก 10 ปี									
		กระตุ้นด้วยวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน แทนวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ 1 ครั้ง									
วัคซีนไข้หวัดใหญ่	1 เข็ม	ทุกปี ปีละ 1 เข็ม							ดูข้อมูลเพิ่มเติม	ทุกปี ปีละ 1 เข็ม	
วัคซีนโควิด 19	1 เข็ม	ทุกปี ปีละ 1 เข็ม						1–2 เข็ม			
วัคซีนหัด คางทูม และหัดเยอรมัน		2 เข็ม					2 เข็ม ถ้าฉีดสี่ ตั้งแต่ 200 และ ร้อยละ 15 ขึ้นไป		ปลูกถ่ายอวัยวะ	2 เข็ม	
									ปลูกถ่ายเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือด		
วัคซีนอีสุกอีใส		2 เข็ม					2 เข็ม ถ้าฉีดสี่ ตั้งแต่ 200 และ ร้อยละ 15 ขึ้นไป		ปลูกถ่ายอวัยวะ	2 เข็ม	
									ปลูกถ่ายเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือด		
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี	2 เข็ม			2 เข็ม	2 เข็ม	2 เข็ม		2 เข็ม	2 เข็ม		
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี	3 เข็ม	3 เข็ม	ดูข้อมูลเพิ่มเติม	3 เข็ม		ดูข้อมูลเพิ่มเติม	3 เข็ม	4 เข็ม ถ้าปลูก ถ่ายอวัยวะ 3 เข็ม ถ้าปลูกถ่าย เซลล์ต้นกำเนิด เม็ดเลือด	3 เข็ม		
วัคซีนเอชพีวี							3 เข็ม				
วัคซีนนิวโมค็อกคัส		ดูข้อมูลเพิ่มเติม									
วัคซีนอาร์เอสวี	ชนิดโหวาเลนส์ 1 เข็ม		1 เข็ม ถ้าอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป								
วัคซีนจูสวัต (ชนิดเชื้อเป็น)							ถ้าฉีดสี่ น้อยกว่า 200				
วัคซีนจูสวัต (ชนิดไม่ใช้เชื้อเป็น)							2 เข็ม				
วัคซีนไข้เลือดออก			2 หรือ 3 เข็ม ขึ้นกับชนิดของวัคซีน				ถ้าฉีดสี่ น้อยกว่า 200			2 เข็ม	
วัคซีนไขสันหลังอักเสบ							ถ้าฉีดสี่ น้อยกว่า 200			2 หรือ 3 เข็ม	
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น						ดูข้อมูลเพิ่มเติม	ถ้าฉีดสี่ น้อยกว่า 200	ถ้าได้รับยายับยั้งคอมพลีเมนต์		ดูข้อมูลเพิ่มเติม	
วัคซีนไข้เหลือง							ถ้าฉีดสี่ น้อยกว่า 200			1 เข็ม	
วัคซีนพิษสุนัขบ้า										2 เข็ม	

*หน่วยของซีดีสี่คือเซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร

แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ตามอายุ
หรือไม่มีหลักฐานว่ามี
ภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรค

พิจารณา (วัคซีนทางเลือก)
สำหรับผู้ใหญ่ตามอายุ

แนะนำสำหรับผู้ใหญ่
ที่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม

แนะนำตามการตัดสินใจ
ทางคลินิกร่วมกัน

ห้ามฉีดหรือต้องระมัดระวัง

ไม่มีคำแนะนำโดยเฉพาะ